

الأنسجة الضامنة

خصائص الأنسجة الضامنة

- تتكون من خلايا قليلة - متباينة و ألياف و مادة بيئية
- النسيج الدموي خال من الألياف
- المادة البيئية قد تكون شبه صلبة كما في الغضروف أو صلبة كما في العظم أو طرية كما في معظم الأنسجة الضامنة
- وجود أو عية دموية

وظائف الأنسجة الضامنة

التدعم : و يتمثل ذلك في عظام العمود الفقاري والأطراف

الحماية:

- ميكانيكية كما في الجمجمة التي تحمي الدماغ والقفص الصدري الذي يحمي الرئتين والقلب
- كيميائية:

- تلتهم بعض مكونات الأنسجة الضامنة مثل الخلايا الأكولة phagocytes للأجسام الغريبة و تفككها بإنزيماتها
- الخلايا البلازمية تكون أجسام مضادة antibodies تتحدى مع الأجسام الغريبة كالبكتيريا والفيروسات
- تخزين الدهون للتزود بالطاقة كما في الخلايا الدهنية adipocytes
- ربط الأنسجة المختلفة ببعضها:
 - الأربطة ligaments تشد العظام إلى العظام

منشأ الأنسجة الضامنة


• تنشأ من خلايا طبقة الميزودرم mesenchyme و يسمى النسيج الضام الجنيني بالميزنشيم

خلايا الأنسجة الضامنة

A. الخلايا الثابتة Fixed Cells


1. الخلايا الليفية

- هذا النوع هو الأكثر شيوعا و تقوم بتصنيع الألياف و المادة البيئية منها نوعان هما: **الخلايا الليفية اليفعة Fibroblasts** (خلايا نشطة) و **الخلايا الليفية الناضجة Fibrocytes**




2. الخلايا الأكولة : Macrophages or Histiocytes

- الوظيفة: التهام الأجسام الغريبة مثل الفيروسات والبكتيريا



3. الخلايا الدهنية: adipocytes

- نقوم هذه الخلايا بتخزين الدهون و إنتاج الطاقة





B. الخلايا المتجولة Free or wandering cells

و تضم 07 أنواع هي :


a. الخلايا الصاربة Mast Cells

- i. الوظيفة: إطلاق مواد كيميائية تعزز تفاعلات الحساسية الفورية



b. الخلايا البلازمية Plasma cells

- i. توجد بوفرة في مواقع معرضة لاختراق البكتيريا والأجسام الغريبة إضافة إلى المناطق المصابة بالتهاب مثل: بطانة الأمعاء
- ii. الوظيفة: إنتاج أجسام مضادة antibodies تتفاعل مع أجسام غريبة وتبطل مفعولها



c. الخلايا الصبغية Melanocytes


- i. خلايا متفرعة تحتوي على صبغة الميلانين، توجد في طبقة الأدمة في الجلد و قزحية العين



d. خلايا الدم البيضاء: White blood cells or leucocytes

- i. كثيراً ما توجد خلايا الدم البيضاء في النسيج الضام ذلك أنها تعبر جدر الشعيرات الدموية والأوردة بشكل دائم و ترداد أعدادها في حالة التهاب الأنسجة

e. الخلايا الليمفاوية Lymphocytes

- i. تتميز لنوعين : هما - B Cells و T Cells






f. الخلايا متعادلة الأصباغ :**Neutrophils**
i. خلايا أكولة ، تتجذب لموقع الالتهاب

g. الخلايا حامضية الأصباغ :**Eosinophils**

i. يزداد عددها في الحالات التي يتعرض فيها الإنسان إلى أمراض طفيلية و إلى الحساسية


ألياف الأنسجة الضامة



هي ثلاثة أنواع:



1. ألياف كولاجين **Collagen fibers**

- غير قابلة للتمدد
- يطلق عليها الألياف البيضاء
- توجد في حزم منتظمة أو مبعثرة
- تتشكل الألياف الكولاجينية من بروتين الكولاجين نوع I



2. ألياف المرنة **Elastic fibers**

- تتألف الألياف المرنة من بروتين الاستين Elastin ذو المرونة العالية
- توجد في الأنسجة أما فرادى أو على هيئة طبقات متقدبة كما في جدر الأوعية الدموية
- تقل مرونتها بتقدم السن نتيجة لذلك تنشأ موضع تخلص في الشرايين



3. الألياف الشبكية Reticular fibers

- تتشكل من ألياف كولاجين نوع III
- تكون شبكة ليفية في الأعضاء الليمفاوية و في الأنسجة العضلية وأغشية الألياف العصبية

المادة الأساسية Ground Substance

تتركب من معقد من يتشكل من :

(chondronectin ، laminin ، fibronectin) Glycoproteins (a)
Proteoglycans (b)

يملأ هذا المعقد الحيز بين خلايا وألياف الأنسجة الضامة وبالتالي يساهم بربطها مع بعضها البعض
تعمل هذه المادة الأساسية ك حاجز يمنع اختراف الأجسام الغريبة للأنسجة الضامة

أنواع الأنسجة الضامة

A. الأنسجة الضامة الأصلية وتشمل:

1. الأنسجة الفجوية
2. الأنسجة الكثيفة

B. الأنسجة الضامة ذات الصفات الخاصة ومنها:

1. الأنسجة الدهنية
2. الأنسجة المرنة
3. الأنسجة المخاطية
4. الأنسجة الوعائية

C. الأنسجة الضامة الهيكيلية / الداعمة وتشمل:

1. الغضروف
2. العظم



A. الأنسجة الضامة الأصلية

سميت بالأصلية لأن المكونات الأساسية للأنسجة الضامة تظهر فيها بوضوح

1. النسيج الضام الأصيل الفجوى / الخلالي : Connective Areolar tissue

- هو الأكثر شيوعاً بين الأنسجة الضامه الأصيله
مميزاته:

- ويتميز بوجود فجوات خلاليه تعطى شكل شبكي و هو يكون الطبقة الموجودة بين الجلد والعضلات كما يربط العضلات المختلفة بعضها البعض ويوجد أيضاً في القناة الهضمية.
- يحتوي معظم مكونات الأنسجة الضامه من ألياف وخلايا ومادة أساسية
- الألياف الأكثر شيوعاً هي ألياف الكولاجين بينما الألياف الشبكية قليلة
- بالنسبة للخلايا فإن الليفية والأكولة هي الأكثر شيوعاً
- المادة الأساسية كثيرة و عديمة الشكل و هي طرية و غنية بالأوعية الدموية
- ويحتوي على كمية كبيرة من المادة بين الخلوية الالاتينية التي توجد بها أنواع مختلفة من الخلايا والألياف



Photomicrograph: Areolar connective tissue, a soft packaging tissue of the body (400x).


2. النسيج الضام لأصيل الكثيف:

مميزاته:


- يحتوي نفس مكونات الأنسجة الفجوية غير أن كثافة الكولاجين فيه أكثر و عدد الخلايا أقل (تكون فيه الألياف كثيفة وبكميات كبيرة)
- يتواجد في الأوتار والأربطة

1. نسيج ضام كثيف غير منتظم Irregular connective tissue

- تكون ألياف الكولاجين **مبعثرة** في عدة اتجاهات
- الألياف البيض هي السائدة في هذا النسيج
- وتوجد ايضاً الألياف الصفراء والشبكية لكن بأعداد قليلة
- المادة الأساسية قليلة مقارنة بالأنسجة الفجوية
- الألياف تتشابك فيما بينها بغير انتظام وفي اتجاهات مختلفة
- يوجد هذا النوع في ادمة الجلد Dermis of skin لهذا يقاوم التوتر من مختلف الاتجاهات وكذلك المحافظ التي تحيط بالعديد من الأعضاء.



Photomicrograph: Dense irregular connective tissue from the dermis of the skin (400x).




نسيج كثيف منتظم :Regular connective tissue


تكون ألياف الكولاجين منتظمة /متوازية
تحتوي بين حزمها خلايا ليفية كما في الأوتار والأربطة



Photomicrograph: Dense regular connective tissue from a tendon (1000 \times).



Elastic Connective Tissue



- Black = elastic fibers,
- Pink = collagen fibers
- Nuclei are mostly fibroblasts

21

1. الأنسجة المرنة:

- تتشكل من حزم من الألياف المرنة الكثيفة و المتوازية
- يشغل الحيز بين هذه الحزم ألياف كولاجين و خلايا ليفية مسطحة
- توجد في الأربطة الصفراء للعمود الفقري

2. الأنسجة المخاطية:


لهذه الأنسجة وفرة من المادة الأساسية عديمة الشكل تتكون بشكل رئيسي من حمض هيداليلورونيك

- هذه الأنسجة هلامية القوام تحتوي على ألياف كولاجين والألياف المرنة و خلايا ليفية

- خلايا متفرعة أو مغزلية الشكل مبعثرة أو تتشابك في بعض الأحيان.

المادة بين خلويات غروية وتحتوي على مخاط (Mucin).

توجد في الحبل السري للأجنة وفي لب الأسنان




3. الأنسجة الدهنية:

ت تكون بشكل رئيسي من خلايا دهنية لها ارتباط وثيق بالأوعية الدموية

ـ يحتوي جسم الإنسان نوعين من النسيج الدهني:

• **الأبيض** خليته وحيدة الحجيرة الدهنية، و يتواجد تحت الجلد ونخاع العظم يعمل هذا النسيج كماس للصدمات و كمصدر للطاقة و كغاز حراري

• **البني** خليته متعددة الحجيرات الدهنية ، و يتواجد تقريبا في كل الثدييات يعمل على توليد الحرارة



4. الأنسجة الوعائية (الدم)

لا يحتوي على ألياف

يتكون من:

(a) خلايا الدم:


• خلايا الدم الحمراء،

• خلايا الدم البيضاء الخلايا الحبيبية (ثلاثة أنواع: الخلايا المتعادلة والخلايا حامضية الأصباغ والخلايا قاعدية الأصباغ)

• والخلايا غير الحبيبية (الخلايا الليمفاوية والخلايا الأحادية)

• الصفائح الدموية (لا تحتوي على أنواعه وتنشأ من خلايا كبيرة النوى megakaryocytes في نخاع العظم)


(b) **البلازما**: مادة بينية سائلة



الأنسجة الضامة الهيكلية/ الداعمة

النسيج الغضروفي

صفات الأنسجة الغضروفية:




- تتكون من خلايا غضروفية chondrocytes تصنف المادة البيئية و تتموضع هذه الخلايا داخل فجوات تسمى فرجات lacunae تحاط بمحافظ capsules
- تحتوي المادة البيئية كولاجين و chondroitin و chondronectin و Hyaluronic acid و sulfate
- يحتوي الغضروف المرن كمية كبيرة من بروتين Elastin
- لا تحتوي أية أوعية دموية و نتيجة لذلك لا تتصف الخلايا الغضروفية بنشاط أيضي كبير
- تحاط بنسيج ضام كثيف يدعى محيط الغضروف perichondrium :

- غني بالأوعية الدموية و يقوم بتزويد النسيج الغضروفي بالمواد الغذائية
- يعمل كمصدر للخلايا الغضروفية اليافعة chondroblasts التي تلزم لنمو الغضروف

أنواع الأنسجة الغضروفية

يصنف النسيج الغضروفي تبعاً لمادته الخلالية إلى 4 أنواع

- . الغضروف الزجاجي
- . الغضروف المرن
- . الغضروف الليفي
- . الغضروف المتخلّس / النسيج العظمي



شكل (5-18): قطاع بالمجهر الضوئي يوضح الغضروف الزجاجي.
(Hyaline cartilage)

A. النسيج الغضروفي الزجاجي Hyaline cartilage

- سمى كذلك لأن مادته الأرضية شفافة ورائقة كالزجاج

- يحتوي كولاجين II تزيد من قوته من أضعف أنواع الغضروف قوة

- يحيط به نسيج المسمى "محيط الغضروف"

- يوجد في ممرات التنفس الكبيرة مثل القصبة الهوائية و في تمفصل الأضلاع مع القص

Sternum




Fig. 7.21. Yellow elastic fibrocartilage.

B. النسيج الغضروفي المرن Elastic cartilage

- يختلف عن الغضروف الزجاجي في الأمور التالية:

- يحتوي شبكة غنية بالألياف المرنة إضافة إلى كولاجين (II)

- يوجد به محيط غضروفي perichondrium

- يميل لونه للأصفرار و يعود ذلك لوجود الألياف المرنة

- يتصرف بالقدرة على التمدد والطي

- يوجد في صوان الأذن و لسان المزمار


C. النسيج الغضروفي الليفي Fibrocartilage

- يحتوي على ألياف كولاجين I أما على هيئة حزم غير منتظمة

- بين الخلايا الغضروفية أو تكون موازية لصفوف هذه الخلايا

- لا يوجد محيط غضروفي perichondrium

- مثال : الأقراص بين الفقرات intervertebral disc



D. النسيج العظمي / Bone tissue

صفات النسيج العظمي:

- يتكون من مادة ببنية متكلسة

- يحتوي 3 أنواع من الخلايا:

• العظمية الفتية osteoblasts التي تصنع المواد العضوية للعظم

• العظمية الناضجة osteocytes و توجد في

فرجات lacunae

• العظمية المفككة osteoclasts المعنية بتفكيك

العظم و إعادة بنائه


- يحتوي ألياف كولاجين

- له محيط خارجي و آخر داخلي و كلاهما يحتوي

خلايا مولدة للعظم osteogenic cells

- تتخلله أو عيه دموية توصل المواد الغذائية للخلايا

العظم



أنواع الخلايا العظمية

1. الخلايا العظمية الفتية Osteoblasts

- تصنع هذه الخلايا المواد العضوية في العظم مثل كولاجين I و Glycoproteins

▪ الصفات:

• تتموضع على أسطح النسيج العظمي بشكل متراص

2. الخلايا العظمية الناضجة Osteocytes


- تنشأ من الخلايا الفتية و توجد داخل فرجة lacuna

▪ الصفات:


• لها بروزات سيتوبلازمية تتصل فيما بينها بروابط فجوية و هذا

ما يمكن الخلايا من تبادل المواد الغذائية

• تستقر هذه البروزات داخل قنوات canaliculi اسطوانية



3. الخلايا العظمية المفككة Osteoclasts




تنشأ من اندماج خلايا أحادية النواة monocytes في نخاع العظم

- الصفات:

- كثيرة التفرع وتحتوي 5 و 50 نواة

- تتموضع داخل انخفاضات في قالب العظم تسمى فرجات هاوشب Howships lacunae



المادة الأساسية للنسيج العظمي Bone tissue Matrix

تتكون من:


- مواد غير عضوية: أملاح الكالسيوم و الفسفور (بكميات كبيرة) ، إضافة إلى البوتاسيوم و الصوديوم و المغنيسيوم و البيكربونات

- مواد عضوية: كولاجين I ، جلوكوز أmino جلايكانز (GAG) مرتبطة بروتينات و عدة بروتينات كربوهيدراتية

- ينقسم النسيج العظمي إلى
 - a. نسيج عظمي كثيف**
 - b. نسيج عظمي إسفنجي**

Dense/Compact Bone tissue (النسيج العظمي الكثيف)

• المميزات :



– انتظام ألياف كولاجين في طبقات و تتركز حول قناة هافرس التي تحتوي على أوعية دموية وأعصاب و يطلق على هذا الترتيب نظام هافرس Haversian System

و تصنف طبقات الكولاجين حسب موقعها إلى:

• طبقات محيطية خارجية outer circumferential

lamellae

• طبقات محيطية داخلية inner circumferential

lamellae

• طبقات بينية interstitial lamellae تمثل بقايا لوحدات هافرس أتلفت أثناء النمو

– وجود مادة بينية متقلبة وألياف كولاجين قليلة بكل نظام هافرس

– وجود الخلايا العظمية في فرجات تكون بين أو داخل طبقات الكولاجين

– وفرة الأملاح و قلة الخلايا

– يوجد هذا النسيج في جسم العظام (diaphysis) الطويلة

Haversian System

• تركيب أسطواني يتصرف بالاتي:


يتكون من قناة مركبة تدعى قناة هافرس Havarsian Canal

تحاطط بطبقات من ألياف الكولاجين والمادة بينية

تحتوي على أعصاب وأوعية دموية ونسيج ضام طري


تتصل مع بعضها ومع تجاويف نخاع العظم بقنوات تسمى قنوات فولكمان Volkman canals

تنظم ألياف الكولاجين بحيث تكون طولية في طبقة ومستعرضة في الطبقة التالية وهذا ما يعطي العظم قوة كبيرة



العظم الأسفنجي

- يوجد هذا النوع في العظام القصيرة
- يتكون من حواجز غير منتظمة تتشارك مع بعضها تحصر بينها فراغات تحتوي على نخاع العظام الأحمر
- تتكون هذه الحواجز من صفائح عظمية وفجوات عظمية وقنوات .



Spongy Bone Structure