


تركيب البروتين

توجد أربعة أنظمة تختص بتركيب البروتينات هي:

- التركيب الأولي Primary Structure

يشير هذا التركيب إلى نوعية وتسلسل الأحماض الأمينية في سلسلة متعدد الببتيد . ولا يشمل هذا المصطلح أي قوى او اواصر اخرى موجودة بين الأحماض الأمينية ما عدا الأواصر الببتيدية ، كما ان دراسة الأصرة الببتيدية تدخل ضمن دراسة هذا التركيب . ويجب ملاحظة ان عدد الأحماض الأمينية في البروتين يعطي فكرة عامة عن حجم البروتين (وزنه الجزيئي) فقد اشار الباحثين الى انه يمكن ان يعد صفة اضافية الى التركيب الأولي.



الشكل(5-13): النهاية الكاربوكسيلية والأمينية Carboxy and amino terminus للببتيدات.


الشكل (1) : التركيب الأولي للبروتين.

- التركيب الثانوي Secondary Structure

يتضمن التركيب الثنائي للبروتين كيفية التواء سلسلة متعدد الببتيد لتعطي اشكال نوعية ثابتة عن طريق الأصرة الهيدروجينية اذ بالاعتماد على نوعية الأحماض الأمينية وصفاتها الكيميائية يمكن ان تتشكل عدة نماذج من حالة الالتواء التي تشمل التركيب الثنائي هي:

أ- المنحى الحلزوني ألفا Helix α : يتميز المنحى الحلزوني بوجود 3.6 وحدة حامض اميني لكل دورة من المنحى ويقدر قطر الحلزون ب 10 انكستروم. تبرز مجاميع R الى الخارج من العمود الفقري لمتعدد الببتيد . ان التركيب الحلزوني هذا ناجم عن وجود الأصرة الهيدروجينية بين اوكسجين الكاربونيل وهيدروجين الأميد.


وبما ان اصرة الببتيد تتعاقب بمسافات منتظمة ، لذلك فأن هذه الاصر تكون كذلك منتظمة وبالتالي فأن هذا النظام يسمح للبروتين ان يأخذ شكلاً حلزونياً يسمى احياناً الحلزون الفا يمين الاتجاه Right handed α -helix .



الشكل (2) : التركيب الحلزوني للبروتين .

يعد ألفا- كيراتين النموذج الذي يمثل الحلزون ألفا وذلك لاحتوائه على اعداد كبيرة من سلاسل الببتيد المتعددة المرتبطة بالأصرة الهيدروجينية ولكونه غنيا بالحامض الأميني السستاين الحاوي على جسر ثانوي الكبريت المطمور في حشوة البروتين غير الذائب .

بـ- الصفيحة المطوية Pleated Sheet : تترتب سلاسل الببتيد على امتداد بعضها البعض لتكون اشكالاً يطلق عليها الصفائح المطوية اذ تمتد سلاسل متعدد الببتيد بأبعاد متعرجة تشبه شكل الزركازك وتكون هذه الصفائح مستقرة بوساطة اصرة الهيدروجين التي تربط مجموعة كاربونيل CO مع مجموعة أميد NH . و تكون مجموعة R واقعة في اعلى الصفائح وأسفلها والتي تترتب السلاسل الببتيدية فيها اما باتجاه واحد او اتجاهين متعاكسين، بدون حصول تزاحم كلي للمجموعات R في الأحماض الأمينية المكونة للسلاسل . و يعد تركيب الحرير الطبيعي (البروتين الليفي للحرير) نموذجاً للفيحة المطوية من نوع β - pleated sheet .




الشكل (3) : الصفيحة المطوية أ- باتجاه واحد. ب- باتجاهين متعاكش.

3- التركيب الثلاثي Tertiary Structure

يتضمن هذا التركيب البعد الثلاثي للبروتين الكروي الناتج عن تداخلات المجاميع الجانبية R-group مع بعضها ، اذ تجعل سلسلة متعدد الببتيد مطوية بشدة ومكتفة بصورة مرسومة على هيئة كرة صوف النسج . ويمكن ان يعرف التركيب الثلاثي بموقع المجاميع الجانبية والهيدروجين في الفراغ بالنسبة لمستوى اصرة الببتيد. ان استقرار التركيب الثلاثي للبروتين يعزى الى الروابط والقوى الموجودة والمذكورة سابقا. ومن الأمثلة عليه بروتين المايكروبين الذي يعمل على نقل الأوكسجين في العضلات ويحتوي على سلسلة واحدة من متعدد الببتيد مكونة من 135 حامض اميني ومجموعة الهيم الحاوية على الحديد. ويوضح الشكل التالي العمود الفقري لجزئية المايكروبين المكونة من ثمان قطع مستقيمة ومنفصلة بواسطة انحنيات. ان تركيب كل قطعة من هذه القطع هو عبارة عن التركيب الحزاوني الفا، غير ان الشكل العام للمايكروبين نفسه الناجم عن التداخلات للمجاميع الجانبية هو الذي يعطي التركيب الثلاثي الابعد والذي يتصرف بما يلي :

1- ان سلاسل متعدد الببتيد تكون مطوية بإحكام اذ لا تدع مجالاً الا لعدد قليل من جزيئات الماء بان تكون في الداخل.

- 2- تقع جميع المجاميع الجانبية لوحدات الاحماس الامينية القطبية مثل اللايسين والارجينين وحامض الكلوتاميك والاسباراتك والسيرين والثريونين والهستدين تقريباً على السطح الخارجي للجزئية وتكون معرضة للماء وهذا يدل على ان القوى الايونية تأثيراً ضعيفاً في استقرار البروتين.
- 3- تخفي المجاميع الجانبية للأحماس الامينية غير القطبية الى الداخل من جزئية البروتين مثل الفالين والليوسين ولهذا السبب فان معظم البروتينات غير قابلة للذوبان في المذيبات العضوية .
- 4- ان وحدات البرولين لا تستطيع المشاركة في التركيب الحلزوني الفا ويكون موقعه في انحاءات سلسلة متعدد البتيد.
- 5- تعد وحدة الهيم الحاوية على الحديدوز هي الاخرى غير قطبية كارهة للماء وتكون الى الداخل مع الاحماس الامينية غير القطبية.




الشكل (4) : التركيب الثالثي لبروتين المايوكلوبين.

- التركيب الرابعی : Quaternary Structure - 4

اذا احتوى بروتين (متعدد ببتيد) على اكثر من سلسلة ببتيدية فان البروتين ينتمي الى التركيب الرباعي وهذا التركيب هو ترابط مجموعة الوحدات الثانوية للبروتين protein subunits سواء كانت متشابهة او غير متشابهة لتكون ما يسمى Oligomer (اي بولимер صغير) .

ومن ناحية اخرى فان مصطلح التركيب الرباعي يشير الى عدد وحدات البروتين التي يجب ان ترتبط مع بعضها لتكون الصيغة الفعالة لذلك البروتين من الناحية الحيوية . ومن الأمثلة على التركيب الرباعي هو جزيئه الهيموكلوبين التي تتكون من اربع سلاسل ببتيدية (اربع وحدات) اثنين ألفا واثنتين بيتا تتدافع مع بعضها بواسطة الاواصر والقوى لتعطي شكل ربعي الأسطح .



الشكل (5) : التركيب الرباعي للهيموكلوبين .

ذوبانية البروتينات :

تحتوي البروتينات على مجاميع مختلفة من الحامضية - القاعدية وبالتالي فهي تختلف في الذوبانية بالاعتماد على عدة عوامل منها:

- 1- تتأثر درجة الذوبانية كثيراً بقيمة pH إذ تكون درجة الذوبانية عند أدنى مستوى (ازدياد ترسيب البروتين) في نقطة التعادل الكهربائي (وهي درجة pH التي يكون فيها محصلة الشحنة على البروتين صفراء ولا تتحرك في المجال الكهربائي) وتزداد كلما ابتعدنا عن هذه النقطة في الاتجاهين الحامضي او القاعدي .
- 2- تتأثر ايضاً بتراكيز الأملاح المذابة في محلول فعند استخدام كبريتات الأمونيوم يلاحظ انه يعمل على ترسيب العديد من البروتينات وكل بروتين كمية محددة من الملح المستخدم لترسيبها.
- 3- نقل الذوبانية للعديد من البروتينات باستخدام مذيبات عضوية.
- 4- الحرارة تساعد في تجلط البروتينات .
- 5- المعادن الثقيلة تعد عوامل مرتبطة ببروتينية فعالة.

تغيير الحالة الطبيعية للبروتين (المسخ : Denaturation)

يشمل هذا التغيرات التي تطرأ على جزيئات البروتين من النواحي الفيزيائية والكيميائية والخواص الحيوية وبالتالي يؤدي الى تغير حالياته الطبيعية وينتج عنها فقدان الصفات الفسيولوجية للبروتين مثل الأنزيمات تفقد فعاليتها.

العوامل المسببة للمسخ:

- 1- درجة حامضية او قاعدية عالية جداً تحرق الاواصر الهيدروجينية فيه.
- 2- درجة حرارة عالية .
- 3- الموجات فوق الصوتية Ultrasonic vibration .
- 4- أملاح المعادن الثقيلة مثل أملاح ايونات الفضة Ag^+ او الزئبق Hg^{2+} الايونات التي يمكن ان تتحدد مع مجموعات الثايلول SH وترسب البروتين.
- 5- الأشعة فوق البنفسجية UV-ray او الأشعة السينية X-ray .
- 6- تعرض البروتين الى مذيبات عضوية مثل الأسيتون والايثانول حتى عند درجات حرارة منخفضة .

7-عراض محلوله المائي للتحريك بقوة.

التغيرات التي تطرأ على البروتين الممسوخ :

- 1- انخفاض قابلية الذوبان للبروتين .
- 2- تغيرات في التراكيب الداخلية لبروتين وكذلك في عملية ترتيب الاواصر الببتيدية مع عدم حصول تكسير لها .
- 3- زيادة الفعاليات الكيميائية ومجاميع الثايلول والقابلية الایونية للبروتين .
- 4- سهولة تحلله بواسطة الانزيمات المحللة .
- 5- فقدان جزئي او كلي للفعالية البيولوجية الاصلية.