

**University of Mosul
College of Nursing**



Clinical Presentation and Risk Factors for Uterine Fibroid in Reproductive Age Group in Mosul City

Sanaa Ghazi Mustafa

M. Sc. Thesis
Sciences in Nursing

Supervised by

Dr. Asmaa Abdulrazaq Alsanjary
College of Medicine- University of Mosul

2023 A.D.

1445 A.H.

University of Mosul

College of Nursing

**Clinical Presentation and Risk Factors for Uterine
Fibroid in Reproductive Age Group in Mosul City**

A Thesis Submitted

By

Sanaa Ghazi Mustafa

To

The Council of the College of Nursing

University of Mosul

In Partial Fulfillment of the Requirements for

The Degree of Master of Sciences in Nursing

Supervised by

Dr. Asmaa Abdulrazaq Alsanjary

Lecturer

2023 A.D.

1445 A.H.

الخلاصة

المعلومات الأساسية: الأورام الليفية الرحمية هي أكثر الأورام الحميدة التي تصيب الأعضاء التناسلية الأنثوية شيوعاً، وترتبط بمرضه كبيرة وتضرر نوعية الحياة. قد تكون بدون أعراض أو تسبب مجموعة من الأعراض الشديدة والمزمنة. أكثر أعراض العرض شيوعاً هو نزيف الحيض الغزير، الذي يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، والتعب ودورات الحيض المؤلمة. تشمل أعراض الأخرى الألم غير الدوري، وبروز البطن، والجماع المؤلم أو ضغط الحوض، وخلل المثانة أو الأمعاء مما يؤدي إلى سلس البول أو احتباس البول، أو الألم أو الإمساك. قد يرتبط أيضاً بمشاكل الإنجاب، بما في ذلك ضعف الخصوبة ومضاعفات الحمل وفقدانه ونتائج الولادة السلبية

الأهداف: تقدير الشكل الأكثر شيوعاً ونوع الأورام الليفية الرحمية بين النساء، وتحديد عوامل الخطر المرتبطة بالورم الليفى الرحمي، وإيجاد العلاقة بين دراسة النتيجة والمتغير المختار.

الطرائق والأدوات: تم تصميم الدراسة الوصفية المقطعية على (188) امرأة مصابة بالورم الليفى الرحمي اللائي يترددن على مستشفيات مدينة الموصل. لتحقيق أهداف الدراسة، تم استخدام استبيان مقابلات منظم لجمع المعلومات المتعلقة بالمعلومات الديموغرافية، والتاريخ التوليدي وأمراض النساء، والعرض السريري، وخصائص الأورام الليفية الرحمية. تمتد فترة الدراسة من 16 ديسمبر 2022 إلى 20 مارس 2023.

النتائج: كانت أعلى نسبة من العينة نساء في الفئة العمرية 31 - 38 سنة (42.6%)، فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية، وأعلى نسبة ممثلة للأفراد المتزوجين (58.0%)، والغالبية العظمى من الأفراد لا يدخنون (96.8%)، 69.7% من الأفراد ليس لديهم خصوبة. فاد غالبية المشاركين (48.4%) بوجود ورم ليفي واحد، وكان النوع الأكثر شيوعاً من الأورام الليفية التي تم الإبلاغ عنها داخل الرحم (59.6%)، وأبلغت النسبة الأكبر من المشاركين (68.6%) عن وجود حجم

بين 1 و 1.5 سم، تشخيص بالموجات فوق الصوتية (93.6%)، تم تشخيصهم في سن 28-36 سنة وكانت نسبتهم (56.4%)
الاسبوع) (60.5%).

الاستنتاجات والتوصيات: اشيرت الدراسة إلى أن معظم أفراد عينة الدراسة كانوا يشكون من آلام في الظهر وأن أقل شيوعاً هو بدون أعراض. توصي الدراسة بضرورة إجراء الفحص الروتيني بالموجات فوق الصوتية لدى النساء في سن الإنجاب في وقت مبكر من أجل إدارتها على الفور لمنع المضاعفات المرتبطة بها.

الكلمات المفتاحية: الورم الليفي الرحمي، الأعراض السريرية، عامل الخطر، سن الإنجاب.

المظاهر السريرية وعوامل الاختطار للأورام الليفية في الرحم لدى
النساء في سن الانجاب بمدينة الموصل

رسالة تقدم بها

سناء غازي مصطفى

إلى

مجلس كلية التمريض / جامعة الموصل

وهي جزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التمريض

بإشراف

د. أسماء عبد الرزاق السنجري

جامعة الموصل / كلية الطب



جامعة الموصل
كلية التمريض

المظاهر السريرية وعوامل الاختطار للأورام الليفية في الرحم لدى النساء في سن الانجاب بمدينة الموصل

رسالة ماجستير
علوم في التمريض

سناء غازي مصطفى

بإشراف
د. أسماء عبد الرزاق السنجري
جامعة الموصل / كلية الطب