

Iraqi Ministry of Higher Education and Scientific Research University of Mosul College of Nursing



Knowledge of Childbearing Age Women Regarding Placenta Previa at Mosul City

A Graduation Project Submitted By

Ahmed Fathallah Saleh Hamza Mohammad Natiq Wa'ad Allah

Ahmed Abdel-Razzaq Younis Ahmed Ezz El-Din Khidr

To

The Council Committee of the Clinical Nursing Science Department /
College of Nursing/ University of Mosul
in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree of Bachelors
of Science in Nursing

Supervised

Jwan Mohammed Hassan Al-Naser

Assistant Lecturer

Y. YY A.D. 1557 A.H.

Abstract

Background: Placenta previa is abnormal condition during pregnancy, an obstetric complication, and It is one of the main causes of vaginal bleeding in the second and the third trimester of pregnancy. Aim of the study to assess women knowledge of reproductive age regarding placenta previa in Mosul city.

Methods: The descriptive cross-sectional study was conducted in the department of obstetrics and gynecology at Mosul Teaching Hospitals. The data was collected by interviewing among $({}^{\Upsilon} \cdot {}^{\Lambda})$ women at reproductive age women. A detailed questionnaire was used and consisted of demographic characteristics and women's knowledge toward signs and symptoms, risk factor, diagnosis and management of placenta previa. The validity and reliability of the questionnaire was determined by conducting a pilot study. Different statistical methods was used to analyze the data in this study, Statistical Package for the Social Science (SPSS, version ${}^{\Upsilon} \circ$).

Results: The study results showed that more than half of study sample (\(\frac{1}{7}, \frac{7}{2}\)) were their age between \(\frac{9-77}{9-77}\) years old, most of them housewives and had secondary education. The current study found, there were statistically significant correlation between knowledge of women participant and socio-demographic (women had history of placenta previa) at p-value less than \(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\).

Conclusions and Recommendation: Women participants at Mosul city had poor knowledge level about placenta previa. Special programs, workshop, intervention such as mass media and continuous reproductive advice and education for all women at reproductive age to provide knowledge about such diseases to females.

Keyword:-

Knowledge, Child bearing, Placenta previa

الخلاصة

نُبذة عامة: المشيمة المتقدمة هي حالة غير طبيعية أثناء الحمل ، وهي إحدى مضاعفات الولادة ، وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية للنزيف المهبلي في الثلث الثاني والثالث من الحمل. الهدف من الدراسة تقييم معارف النساء بسن الإنجاب فيما يتعلق بالمشيمة المتقدمة في مدينة الموصل.

المنهجية: أجريت دراسة مقطعية وصفية في قسم أمراض النساء والتوليد في مستشفيات الموصل التعليمية. تم جمع البيانات من خلال مقابلة (٢٠٨) امرأة في سن الإنجاب باستخدام استبيان مفصل يتكون من الخصائص الديموغرافية ومعرفة المرأة تجاه العلامات والأعراض وعوامل الخطر وتشخيص وعلاج المشيمة المتقدمة. تم تحديد المصداقية والثبات الاستبيان من قبل فريق من الخبراء من خلال إجراء دراسة تجريبية. استخداما طرق إحصائية مختلفة لتحليل البيانات في هذه الدراسة من خلال الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) الإصدار ٢٥).

الاستنتاجات و التوصيات: بينت الدراسة الحالية ان لدى المشاركات في مدينة الموصل مستوى ضعيف من المعرفة حول المشيمة المتقدمة. وضع برامج خاصة وورش عمل وتدخلات مثل وسائل الإعلام والاستشارات الإنجابية المستمرة والتثقيف لجميع النساء في سن الإنجاب يوفر المعرفة حول هذه الأمراض للإناث.



جمهورية العراق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الموصل /كلية التمريض



معارف النساء في سن الانجاب حول المشيمة المتقدمة في معارف النساء في سن الانجاب حول المشيمة المتقدمة في

مشروع تخرج مقدم من

محمد ناطق وعدالله احمد عز الدين خضر

احمد فتح الله صالح احمد عبد الرزاق يونس

الي

قسم العلوم التمريضية السريرية / كلية التمريض/جامعة الموصل كجزء من متطلبات نيل شهادة البكالوريوس علوم في التمريض

بإشراف

م.م جوان محمد حسن الناصر

مدرس مساعد

Y. YY A.D. 155 Y A.H.